

LORATADINĂ

BIOFARM

5 mg/5 ml

Sirop

Loratadină



Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recităti.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
- Acest medicament a fost prescris pentru dumneavastră sau pentru copilul dumneavastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleși simptome cu ale dumneavastră.
- Dacă vreuna dintre reacțiile adverse devine gravă sau dacă observați orice reacție adversă nemenționată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneți medicului dumneavastră sau farmacistului.

În acest prospect găsiți:

1. Ce este Loratadină Biofarm și pentru ce se utilizează.
2. Înainte să utilizați Loratadină Biofarm
3. Cum să utilizați Loratadină Biofarm
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Loratadină Biofarm
6. Informații suplimentare

1. Ce este Loratadină Biofarm și pentru ce se utilizează

Loratadină Biofarm aparține unei clase de medicamente cunoscute sub numele de antihistaminice.

Antihistaminicele ajută la reducerea simptomelor alergiei împiedicând efectele unei substanțe numită histamină, care este produsă în corpul nostru.

Loratadină Biofarm ameliorează simptomatologia asociată rinitelor alergice (de exemplu: febra fânului), cum ar fi strănutul, secreția nazală abundantă sau măncărimea nazală, usturimile sau măncărimea oculară.

Loratadină Biofarm poate fi, de asemenea, utilizat pentru reducerea simptomelor de urticarie (măncărime, roșeață, precum și numărul și dimensiunile elementelor eruptive apărute pe piele).

Ameliorarea acestor manifestări se menține pe întreaga perioadă a zilei și vă ajută să vă reluați activitățile zilnice obișnuite și să dormiți în mod

normal.

2. Înainte să utilizați Loratadină Biofarm Nu utilizați Loratadină Biofarm

-dacă sunteți alergic (hipersensibil) la loratadină sau la oricare dintre celelalte componente ale Loratadină Biofarm.

Aveți grija deosebită când utilizați Loratadină Biofarm

Înainte de a utiliza Loratadină Biofarm, informați-l pe medicul dumneavastră sau pe farmacist:
- dacă dumneavastră sau copilul dumneavastră aveți o afecțiune hepatică.

Utilizarea altor medicamente

Nu există interacțiuni cunoscute ale Loratadină Biofarm cu alte medicamente.

Vă rugăm să spuneți medicului dumneavastră sau farmacistului dacă utilizați sau ati utilizat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripție medicală.

Utilizarea Loratadină Biofarm cu alimente și băuturi

Loratadină Biofarm poate fi utilizat în timpul meselor sau între mese.

Dacă este administrat împreună cu alcoolul, Loratadină Biofarm nu crește efectele acestuia.

Sarcina și alăptarea

Dacă sunteți gravidă sau alăptăți, nu este recomandată administrarea de Loratadină Biofarm.

Adresați-vă medicului dumneavastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice medicament.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

În doza recomandată, Loratadină Biofarm nu va determina, probabil, somnolență sau scădere a vitezei de reacție. Totuși, foarte rar, la unele persoane poate apărea somnolență, fapt ce le-ar putea afecta capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Informații importante privind unele componente ale Loratadină Biofarm

Loratadină Biofarm conține zahăr. Dacă medicul dumneavastră v-a atenționat că aveți intoleranță la unele categorii de glucide, vă rugăm să-ți întrebăți înainte de a lua acest medicament.

Dacă sunteți programat să efectuați orice test cutanat pentru alergii, nu trebuie să mai luati

Loratadină Biofarm cu două zile înainte de aceste teste, deoarece medicamentul ar putea influența rezultatele testelor.

3. Cum să utilizați Loratadină Biofarm

Luati întotdeauna Loratadină Biofarm exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Adulți și copii cu vârstă de 12 ani și peste: luati 10 ml sirop o dată pe zi, cu sau fără alimente.

Copii cu vârstă cuprinsă între 2 - 12 ani și greutate peste 30 kg: 10 ml sirop o dată pe zi, cu sau fără alimente.

Copii cu vârstă cuprinsă între 2 - 12 ani și greutate sub 30 kg: 5 ml sirop o dată pe zi, cu sau fără alimente.

Loratadină Biofarm nu este recomandat copiilor sub 2 ani.

Pacienții cu afecțiuni hepatice severe

La adulți și copii cu vârstă cuprinsă între 2 - 12 ani și greutate mai mare de 30 kg: 10 ml sirop o dată la două zile, cu sau fără alimente.

Pentru copii cu vârstă cuprinsă între 2 - 12 ani și greutate sub 30 kg: 5 ml sirop o dată la două zile, cu sau fără alimente.

La pacienții vârstnici sau la cei cu afectarea funcției renale nu necesită reducerea dozei.

Dacă utilizați mai mult decât trebuie din Loratadină Biofarm

Luati Loratadină Biofarm respectând întocmai prescripția medicală. Totuși, dacă ati luat o doză de Loratadină Biofarm mai mare decât cea indicată, luati imediat legătura cu medicul dumneavoastră sau farmacistul.

Dacă uitați să luati Loratadină Biofarm

Dacă ati uitat să luati medicamentul la timp, puteți să o faceți cât mai curând posibil și apoi să reveniți la schema de administrare obișnuită. Nu luati o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetați să luati Loratadină Biofarm

Respectați durata de tratament recomandată de medicul dumneavoastră. Dacă încetați să luati Loratadină Biofarm mai curând decât vi s-a recomandat, manifestările bolii pot să reapară.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, Loratadină Biofarm poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Cele mai frecvente reacții adverse menționate la copii cu vârste între 2 și 12 ani sunt: durerile de cap, nervozitatea și oboseala. Cele mai frecvente reacții adverse menționate la adulți și adolescenți

constau în: somnolență, dureri de cap, creșterea appetitului și tulburări ale somnului (insomnie).

În perioada după punerea pe piață a loratadinei au fost raportate foarte rare cazuri de reacții alergice severe, somnolență, amețeli, palpitații, greață, uscăciune a gurii, indigestie, probleme hepaticе, cădere părului, erupții pe piele sau oboseală. Dacă vreuna dintre reacțiile adverse devine gravă sau dacă observați orice reacție adversă nemenționată în acest prospect, vă rugăm să spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului.

5. Cum se păstrează Loratadină Biofarm

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor. A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

A se utilizează în maxim 28 de zile după prima deschidere a flaconului.

Nu utilizați Loratadină Biofarm după data de expirare înscrisă pe ambalaj. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să eliminați medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Informații suplimentare

Ce conține Loratadină Biofarm

- Substanța activă este loratadina 5 mg în 5 ml sirop

- Celelalte componente sunt: propilenglicol, glicerol, zahăr, acesulfam de potasiu, benzoat de sodiu, acid citric monohidrat, vanilină, aromă de caise, apă purificată.

Cum arată Loratadină Biofarm și conținutul ambalajului

Loratadină Biofarm se prezintă sub formă de lichid siropos, limpede, slab gălbui, cu gust dulce amăruin și miros caracteristic.

Loratadină Biofarm este disponibilă în cutie cu un flacon din sticlă brună a 100 ml sirop și o măsură dozatoare din PP cu gradații de la 2,5 la 20 ml.

Deținătorul autorizației de punere pe piață și producătorul:

S.C. Biofarm S.A.,
Str. Logofătul Tăutu nr. 99, sector 3, București,
România

Pentru orice informații despre acest medicament, vă rugăm să contactați reprezentanții locali ai deținătorului autorizației de punere pe piață.

Acest prospect a fost aprobat în aprilie 2008.