

Anghirol®

Comprimate, 3,25 mg

Extract uscat din Cynara (anghinare)

corespunzător la acizi cafeilchinici exprimați în acid clorogenic

Compoziție:

Un comprimat conține extract uscat din Cynara (anghinare), corespunzător la acizi cafeilchinici exprimați în acid clorogenic 3,25 mg și excipienți: lactoză monohidrat, amidon de porumb, povidonă K 30, talc, stearat de magneziu.

Grupa farmacoterapeutică:

Terapia vezicii biliare, alte preparate pentru terapia bilei, plante.

Indicații terapeutice:

Ca tratament adjuvant în tulburările dispeptice datorate insuficienței secretorii biliare precum și pentru stimularea secreției și evacuării bilei la persoanele cu risc de litiază biliară.

Scăderea apetitului alimentar.

Preparatele de anghinare sunt folosite tradițional pentru favorizarea funcțiilor de eliminare digestivă și urinară.

Contraindicații:

Alergie la anghinare, la plante din familia Composite sau la oricare dintre excipienții medicamentului.

Obstrucție biliară sau risc crescut pentru obstrucție biliară.

Insuficiență hepatică severă, insuficiență renală acută.

Copii sub 6 ani (datorită formei farmaceutice).

Precauții:

Nu sunt necesare în cazul administrării corecte a medicamentului.

Interacțiuni:

Nu sunt cunoscute.

Atenționări speciale:

Nu se recomandă administrarea medicamentului la pacienții cu colici biliare litiazice sau hiperkinezie biliară. Se recomandă prudență la pacienții cu litiază biliară.

Deoarece medicamentul conține lactoză, administrarea nu este recomandată la pacienții cu intoleranța ereditară la galactoză, deficit de lactază Lapp sau malabsorbție de glucoză-galactoză.

Sarcina și alăptarea:

Nu există date care să evidențieze că medicamentul influențează sarcina sau alăptarea.

Capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje:

Medicamentul nu influențează capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Doze și mod de administrare:

Adulți: doza recomandată este de 2 - 3 comprimate Anghirol de 3 ori pe zi înaintea meselor.

Copii între 7 și 10 ani: doza recomandată este de un comprimat Anghirol de 3 ori pe zi înaintea meselor.

Copii între 10 și 15 ani: doza recomandată este de 1 - 2 comprimate Anghirol de 3 ori pe zi înaintea meselor.

Reacții adverse:

După doze mari pot să apară greață, amețeli, senzație de căldură.

Supradozaj:

Nu au fost semnalate cazuri de supradozaj.

Păstrare:

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Ambalaj:

Cutie cu un blister din Al/PVC a 15 comprimate

Cutie cu 2 blistere din Al/PVC a câte 15 comprimate

Producător:

S.C. Biofarm S.A.,
Str. Logofătul Tăutu nr. 99, București,
România

A.P.P. Nr.: 7742/2006/01-02.

Deținătorul autorizației de punere pe piață:

S.C. Biofarm S.A.,
Str. Logofătul Tăutu nr. 99, București,
România

Data ultimei verificări a prospectului:

Ianuarie 2007.